

# BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

## ÉPREUVES D'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

SESSION 2025

### MATHÉMATIQUES

#### JOUR 2

Durée de l'épreuve : 4 heures

L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.  
L'usage de la calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

Dès que le sujet est remis, assurez-vous qu'il est complet.  
Ce sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5 avec quatre exercices indépendants.

**Le candidat traite les 4 exercices.**

*Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée.*

*La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de la copie. Les traces de recherche, même incomplètes ou infructueuses seront valorisées.*

## EXERCICE 1 – 6 points

Dans cet exercice, tous les résultats seront arrondis à  $10^{-3}$  près en cas de besoin. Les deux parties de cet exercice sont indépendantes l'une de l'autre.

### Partie A

Au tennis, le joueur qui est au service peut, en cas d'échec lors du premier service, servir une deuxième balle.

En match, Abel réussit son premier service dans 70 % des cas. Lorsque le premier service est réussi, il gagne le point dans 80 % des cas. En revanche, après un échec à son premier service, Abel gagne le point dans 45 % des cas.

Abel est au service. On considère les événements suivants :

- $S$  : « Abel réussit son premier service »
- $G$  : « Abel gagne le point ».

1. Décrire l'événement  $\bar{S}$  puis traduire la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer  $P(S \cap G)$ .
3. Justifier que la probabilité de l'événement  $G$  est égale à 0,695.
4. Abel a gagné le point. Quelle est la probabilité qu'il ait réussi son premier service ?
5. Les événements  $S$  et  $G$  sont-ils indépendants ? Justifier.

### Partie B

À la sortie d'une usine de fabrication de balles de tennis, une balle est jugée conforme dans 85 % des cas.

1. On teste successivement 20 balles. On considère que le nombre de balles est suffisamment grand pour assimiler ces tests à un tirage avec remise. On note  $X$  la variable aléatoire qui compte le nombre de balles conformes parmi les 20 testées.
  - a. Quelle est la loi suivie par  $X$  et quels sont ses paramètres ? Justifier.
  - b. Calculer  $P(X \leq 18)$ .
  - c. Quelle est la probabilité qu'au moins deux balles ne soient pas conformes parmi les 20 balles testées ?
  - d. Déterminer l'espérance de  $X$ .
2. On teste maintenant  $n$  balles successivement. On considère les  $n$  tests comme un échantillon de  $n$  variables aléatoires  $X_i$  indépendantes suivant la loi de Bernoulli de paramètre 0,85. On considère la variable aléatoire

$$M_n = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n} = \frac{X_1}{n} + \frac{X_2}{n} + \frac{X_3}{n} + \dots + \frac{X_n}{n}$$

- a. Déterminer l'espérance et la variance de  $M_n$ .
- b. Après avoir rappelé l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, montrer que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $P(0,75 < M_n < 0,95) \geq 1 - \frac{12,75}{n}$ .
- c. En déduire un entier  $n$  tel que la moyenne du nombre de balles conformes pour un échantillon de taille  $n$  appartienne à l'intervalle  $[0,75 ; 0,95[$  avec une probabilité supérieure à 0,9.

## EXERCICE 2 – 4 points

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple. Pour chaque question, une seule des trois propositions est exacte. Indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre de la proposition choisie. Aucune justification n'est demandée.

Pour chaque question, une réponse exacte rapporte un point. Une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de point.

Dans toutes les questions suivantes, l'espace est rapporté à un repère orthonormé.

1. On considère la droite  $\Delta_1$  de représentation paramétrique  $\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 4 + 2t, \text{ où } t \in \mathbb{R}, \\ z = t \end{cases}$

ainsi que la droite  $\Delta_2$  de représentation paramétrique  $\begin{cases} x = -4 + s \\ y = 2 + 2s, \text{ où } s \in \mathbb{R}. \\ z = -1 + s \end{cases}$

- a. Les droites  $\Delta_1$  et  $\Delta_2$  sont parallèles.
- b. Les droites  $\Delta_1$  et  $\Delta_2$  sont orthogonales.
- c. Les droites  $\Delta_1$  et  $\Delta_2$  sont sécantes.

2. On considère la droite  $d$  de représentation paramétrique  $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 - t, \text{ où } t \in \mathbb{R}, \\ z = 1 + 2t \end{cases}$

et le plan  $P$  d'équation cartésienne :  $4x + 2y - z + 3 = 0$ .

- a. La droite  $d$  est incluse dans le plan  $P$ .
- b. La droite  $d$  est parallèle strictement au plan  $P$ .
- c. La droite  $d$  est sécante au plan  $P$ .

3. On considère les points  $A(3 ; 2 ; 1)$ ,  $B(7 ; 3 ; 1)$ ,  $C(-1 ; 4 ; 5)$  et  $D(-3 ; 3 ; 5)$ .

- a. Les points  $A$ ,  $B$ ,  $C$  et  $D$  ne sont pas coplanaires.
- b. Les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  sont alignés.
- c.  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{CD}$  sont colinéaires.

4. On considère les plans  $Q$  et  $Q'$  d'équation cartésienne respective  $3x - 2y + z + 1 = 0$  et  $4x + y - z + 3 = 0$ .

- a. Le point  $R(1 ; 1 ; -2)$  appartient aux deux plans.
- b. Les deux plans sont orthogonaux.
- c. Les deux plans sont sécants avec pour intersection la droite de représentation

paramétrique  $\begin{cases} x = t \\ y = 7t + 4, \text{ où } t \in \mathbb{R}. \\ z = 11t + 7 \end{cases}$

### EXERCICE 3 – (4 points)

On considère les suites  $(v_n)$  et  $(w_n)$  définies pour tout entier naturel  $n$  par :

$$\begin{cases} v_0 = \ln(4) \\ v_{n+1} = \ln(-1 + 2e^{v_n}) \end{cases} \text{ et } w_n = -1 + e^{v_n}.$$

On admet que la suite  $(v_n)$  est bien définie et strictement positive.

1. Donner les valeurs exactes de  $v_1$  et  $w_0$ .
2. a. Une partie d'une feuille de calcul où figurent les indices et les termes des suites  $(v_n)$  et  $(w_n)$  est reproduite ci-contre. Parmi les trois formules ci-dessous, choisir la formule qui, saisie dans la cellule B3 puis recopiée vers le bas, permettra d'obtenir les valeurs de la suite  $(v_n)$  dans la colonne B.

Formule 1	$\text{LN}(-1 + 2 * \text{EXP}(B2))$
Formule 2	$= \text{LN}(-1 + 2 * \text{EXP}(B2))$
Formule 3	$= \text{LN}(-1 + 2 * \text{EXP}(A2))$

- b. Conjecturer le sens de variation de la suite  $(v_n)$ .
- c. À l'aide d'un raisonnement par récurrence, valider votre conjecture concernant le sens de variation de la suite  $(v_n)$ .
3. a. Démontrer que la suite  $(w_n)$  est géométrique.
- b. En déduire que pour tout entier naturel  $n$ ,  $v_n = \ln(1 + 3 \times 2^n)$ .
- c. Déterminer la limite de la suite  $(v_n)$ .
4. Justifier que l'algorithme suivant écrit en langage *Python* renvoie un résultat quel que soit le choix de la valeur du nombre S.

A	B	C
1 n	v_n	w_n
2 0	1,38629436	3
3 1	1,94591015	6
4 2	2,56494936	12
5 3	3,21887582	24
6 4	3,8918203	48
7 5	4,57471098	96
8 6	5,26269019	192
9 7	5,95324333	384
10 8	6,64509097	768
11 9	7,33758774	1536
12 10	8,03040956	3072
13 11	8,72339402	6144
14 12	9,41645983	12288
15 13	10,1095663	24576
16 14	10,8026932	49152
17 15	11,4958302	98304
18 16	12,1889723	196608
19 17	12,8821169	393216

```
from math import*
def seuil(S):
    V=ln(4)
    n=0
    while V < S :
        n=n+1
        V=ln(2*exp(V)-1)
    return(n)
```

## EXERCICE 4 – 6 points

### Partie A : dénombrement

On considère l'ensemble des nombres entiers relatifs **non nuls** compris entre  $-30$  et  $30$  ; cet ensemble peut l'écrire ainsi :  $\{-30 ; -29 ; -28 ; \dots ; -1 ; 1 ; \dots ; 28 ; 29 ; 30\}$ . Il comporte 60 éléments.

On choisit dans cet ensemble successivement et sans remise un entier relatif  $a$  puis un entier relatif  $c$ .

1. Combien de couples  $(a ; c)$  différents peut-on ainsi obtenir ?

On considère l'événement  $M$  : « l'équation  $ax^2 + 2x + c = 0$  possède deux solutions réelles distinctes », où  $a$  et  $c$  sont les entiers relatifs précédemment choisis.

2. Montrer que l'événement  $M$  a lieu si et seulement si  $ac < 1$ .
3. Expliquer pourquoi l'événement contraire  $\bar{M}$  comporte 1740 issues.
4. Quelle est la probabilité de l'événement  $M$  ? On arrondira le résultat à  $10^{-2}$ .

### Partie B : équation différentielle

On considère l'équation différentielle (E) :  $y' + 10y = (30x^2 + 22x - 8)e^{-5x+1}$  avec  $x \in \mathbf{R}$  où  $y$  est une fonction définie et dérivable sur  $\mathbf{R}$ .

1. Résoudre sur  $\mathbf{R}$  l'équation différentielle :  $y' + 10y = 0$ .
2. Soit la fonction  $f$  définie sur  $\mathbf{R}$  par  $f(x) = (6x^2 + 2x - 2)e^{-5x+1}$ . On admet que  $f$  est dérivable sur  $\mathbf{R}$  et on note  $f'$  la fonction dérivée de la fonction  $f$ . Justifier que  $f$  est une solution particulière de (E).
3. Donner l'expression de toutes les solutions de (E).

### Partie C : étude de fonction

On propose d'étudier dans cette partie la fonction  $f$  rencontrée à la question partie B.2 On rappelle que, pour tout réel  $x$ ,  $f(x) = (6x^2 + 2x - 2)e^{-5x+1}$ .

On note  $f'$  la fonction dérivée de la fonction  $f$ . On appelle  $\mathcal{C}_f$  la courbe représentative de  $f$  dans un repère du plan.

1. On admet que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ . Déterminer la limite de la fonction  $f$  en  $-\infty$ .
2. En utilisant la partie A, montrer que  $\mathcal{C}_f$  coupe l'axe des abscisses en deux points (*les coordonnées de ces points ne sont pas attendues*).
3. En utilisant les parties A et B, montrer que  $\mathcal{C}_f$  possède deux tangentes horizontales.
4. Dresser le tableau de variation complet de la fonction  $f$ .
5. Déterminer en justifiant le nombre de solution(s) de l'équation  $f(x) = 1$ .
6. Pour tout réel  $m$  strictement supérieur à  $0,2$ , on définit  $I_m$  par  $I_m = \int_{0,2}^m f(x) \, dx$ .
  - a. Vérifier que la fonction  $F$  définie sur  $\mathbf{R}$  par  $F(x) = \left(-\frac{6}{5}x^2 - \frac{22}{25}x + \frac{28}{125}\right)e^{-5x+1}$  est une primitive de la fonction  $f$  sur  $\mathbf{R}$ .
  - b. Existe-t-il une valeur de  $m$  pour laquelle  $I_m = 0$  ? Interpréter graphiquement ce résultat.